

PUBLICACIONES DEL MUSEO DE BOTANICA Y ZOOLOGIA

(FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES)

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA)

NÚM. 1

CATALOGO DE LAS AVES DEL MUSEO

PREFACIO

Con el título de "Publicaciones del Museo de Botánica y Zoología" (Facultad de C. E., F. y N.) N° 1, haremos conocer una serie de trabajos de esta institución.

Es necesario, en principio, poner en conocimiento del país, la importancia de sus colecciones y bibliotecas, por lo que iniciamos nuestras publicaciones, con la enumeración del contenido, facilitando así a los interesados, la posibilidad de consultarlas en su oportunidad.

La Universidad Nacional de Córdoba, se encuentra en condiciones inmejorables a causa de la climatología local, que la favorece, para conservar los objetos botánicos y zoológicos, lo que hemos constatado al ver el relativo buen estado de conservación en que se encuentran las colecciones, hechas en parte, hace muchos años, como las clásicas de Lorentz, Hieronymus, Schickendantz, etc. de Botánica, y de Weyenbergh, Schulz, Döring, etc., de Zoología.

Nuestra tarea ha sido desde un principio muy ingrata debido al ambiente desfavorable que han tenido las instituciones de

esta naturaleza en Córdoba, pero hemos de hacer lo posible para imponer el justo valor de las Ciencias Naturales y de los Museos correspondientes.

DR. C. C. HOSSEUS.

Director del Museo de Botánica y Zoología

INTRODUCCION

Desde el año 1890, no se ha hecho publicación de lo existente en el Museo de Zoología de nuestra Facultad. Por tal razón es necesario dar el catálogo de las colecciones que forman su existencia.

En el período comprendido entre la publicación del folleto de Schulz y Stempelmann del año 1890, "Enumeración de las Aves de la Provincia de Córdoba (República Argentina)", artículo publicado en el Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, t. X. pág. 393 y sig., hasta hoy, ha cambiado bastante el contenido de las colecciones de aves; algunas especies se han perdido y otras se han agregado. La colección principal fué hecha por el Sr. F. Schulz como consta en el mismo folleto mencionado. En el período de estadía del Señor Scherer no hubo aumento de aves y recién después del año 1917, empezó un nuevo interés por esta repartición. Además de las colecciones ya existentes, poseemos una colección de esqueletos de pájaros enteros y de cabezas, para facilitar y dar seguridad a las clasificaciones.

Nos hemos guiado para las determinaciones, en primer lugar por las existentes; como éstas eran incompletas, hemos seguido el catálogo de Dabbene y la escasa literatura de nuestra biblioteca.

En general, puede observarse que los catálogos publicados hasta ahora, no satisfacen y por eso hemos agregado algunos da-

tos sobre plumaje, color, etc., para facilitar el conocimiento de las especies.

El asterisco (*) significa ejemplares ya existentes en el Museo antes del año 1918.

G. MOXHAM.

Preparador

ORDEN PASSERIFORMES

SUB-ORDEN OSCINES

FAM. TURDIDAE

PLANESTICUS FUSCATER (Orb. et Lafr.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. pág. 362.

Sinon. — *Turdus fuscater*, Sel. et Salv. Nom. p. 2; Hudson. Arg. Orn. p. 4.

Turdus fuscater Burm., La Plata Reise II. p. 474.

Merula fuscatra (Orb. et Lafr.). Cat. B. B. Mus. V. p. 243. Seeb; Lillo, Aves prov. Tucumán p. 171.

Merula fuscatra (D'Orb. et Lafr.). Cat. B. B. Mus. V. p. 243. Seeb; Lillo, Aves prov. Tucumán p. 171.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂ ♂ ♀) Col. Schulz.
Nom. vulg.: Zorzal.

Nota: Abunda en lugares húmedos en toda la provincia.

PLANESTICUS MAGELLANICUS (King.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 359.

Sinon. — *Turdus falklandicus* Döering, nec (Qu. et G.).
Exp. al Río Negro. Zool. p. 36.

Ejemplares del Museo. * Río Negro. (♂ ♀) Col. Schulz
Nom. vulg.: Zorzal.

Nota: Según Döring muy abundante en las riberas del Río Negro.
La especie *P. Falklandicus* es conocida únicamente de las Islas Malvinas.

PLANESTICUS RUFIVENTRIS (Vieill.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires, serie III. t. XI. p. 358.

Sinon. — *Turdus rufiventris*. Burm. La Plata. Reise II, p. 474.

Turdus rufiventer (Vieill.). Cat. B. B. V. p. 222.

Ejemplares del Museo. * Río Guayquiraró (♂ ♂), Col. Schulz.

Nom. vulg.: Zorzal.

Nota: Según Hudson, Arg. Orn. p. 3, común en las regiones del Río de la Plata; también se encuentra esta especie en la provincia de Córdoba, pero es más bien escasa, fácil de reconocer por el color rojo-ferruginoso del vientre y plumas por debajo de las alas.

PLANESTICUS AMAUROCHALINUS (Cab.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 361.

Sinon. — *Turdus crotopezus*, Burm., La Plata Reise II. p. 474.

Ejemplar del Museo. * Córdoba (♀) Col. A. Döring.

Nom. vulg.: Zorzal.

Nota: No la hemos observado en la Provincia de Córdoba.

PLANESTICUS NIGRICEPS (Cab.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 361.

Sinon. — *Merula nigriceps* (Cab.). Cat. B. B. Mus. V. 254.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂ ♀) Col. Schulz.

Nom. vulg.: Zorzal serrano.

Nota: Es menor y más oscuro que los otros de la misma especie que se encuentran en la Provincia de Córdoba.

PLATYCICHLA FLAVIPES (Vieill.).

Dabbene, Cat. Sis. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires, ser. III. t. XI. p. 363.

Sinon. — *Turdus carbonarius*. Spix. Av. Bras. 169, 1 tb. 67 f 2.

Ejemplar del Museo * Misiones (♂) Col. Exp. de la Com. Arg. de Límites.

Nota: No se encuentra en la Provincia de Córdoba.

Turdus merula.

Ejemplar del Museo. * Alemania (♀) Col. Schulz.

FAM. MIMIDAE

MIMUS SATURNINUS (Licht.) subeps. MODULATOR (Gould.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. II. t. XI. p. 363.

Sinon. — *Mimus modulator* (Gould.); Cat. B. B. Mus. VI. p. 347.

Ejemplares del Museo * Córdoba (♂ ♀). Col. Schulz.

Nom. vulg.: Calandria.

Nota: Se le reconoce fácilmente por su tamaño mayor que en otras especies.

MIMUS PATAGONICUS (Lafre et Orb.) Cat. B. B. Mus. VI. p. 352.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires, ser. III. t. XI. p. 363.

S i n o n. — *Mimus theuca*, Burm., La Plata Reise II p. 474.
Ejemplares del Museo. * La Ensenada (♂ ♂ ♀). Col. Schulz.
Nom. Vulg.: Calandria.

Nota: En sus costumbres y colores se asemeja mucho a *M. modulator*, siendo más chico.

MIMUS TRIURUS (Vieill.); Cat. B. B. Mus. VI. p. 342.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires, ser. III. t. XI. p. 363.

Ejemplares del Museo. * Río Quayquiraró (♂) Col. Schulz. — Córdoba (♀) Col. Moxham.

Nota: Es la especie más común en Córdoba, fácil de reconocer por tener más plumas blancas en la cola y en las alas que las demás especies.

FAM. CINCLIDAE

CINCLUS SCHULZI Cab. Journ. f. Orn. 1883. p. 102.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 357.

Ejemplares del Museo * Tucumán (♂ ♀) Col. Schulz.

Nota: Esta interesante especie fué descubierta por el señor Schulz en la Provincia de Tucumán. No se encuentra la especie en la Provincia de Córdoba.

FAM. POLIOPTILIDAE

POLIOPTILA DUMICOLA (Vieill.). Cat. B. B. Mus. X. p. 444.

Dabbene l. c. p. 364.

S i n o n. — *Culicivora dumicola* Burm., La Plata Reise. II. p. 473.

Culicivora Boliviana, Sel. P. Z. S. 1852. p. 34; Hudson. Arg. Orn. p. 12.

Ejemplares del Museo * Córdoba (♀) Col. Schulz.

Córdoba (♂) Col. E. Rothlin.

Nota: Esta especie se halla en arbustos espinosos y es fácil de reconocer por su color azulado; el pájaro es escaso en Córdoba.

Acceptamos la opinión de Ridgway (Birds of North and Middle America part. III. p. 693, 1904) en fundar una familia aparte, considerando que los caracteres de *Poliopitila* son muy distintos de los demás pájaros de su parentesco.

FAM. TROGLODYTIDAE

TROGLODYTES MUSCULUS (Naum.). subesp. *guarixa* Pucheran (ex Cuvier M. S.). Arch. Mus. Paris VII. p. 338.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 355.

Sinon—*Troglodytes furvus*, Sel. et Salv. P. Z. S. 1869, p. 158.

Troglodytes platensis Burm., La Plata Reise. II. p. 476.

Ejemplares del Museo * Córdoba (♂) Col. Schulz.

Córdoba (♀) Col. Moxham.

Nota: Es muy común en toda la Provincia de Córdoba. Plumaje gris-oscuro; vientre gris claro; alas grises, rayadas de negro; cola amarillo-rojizo, rayada de negro.

TROGLODYTES AURICULARIS Cab. Journ f. Orn. 1833. p. 105.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 356.

Sinon. — *Hemiura auricularis* Cab. Sharp. Hand List of Birds IV. p. 94.

Ejemplares del Museo * Tucumán. (♂♂♀) Col. Schulz.

Nota: No se encuentra en la Provincia de Córdoba. Se le reconoce fácilmente por tener una faja blanca, ancha sobre cada ojo.

CISTOTHORUS PLATENSIS (Lath.). Cat. B. B. Mus. VI. p. 244.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 355.

Döring, Exp. al Río Negro. Zool. p. 37.

Ejemplares del Museo * Tucumán (♂) Col. Schulz.

* Río Negro (♀) Col. Schulz.

Nota: Muy raro en la Provincia de Córdoba. Fácil de reconocer por su color pálido, y su cola más larga que en las otras especies.

FAM. MOTACILLIDAE

ANTHUS FURCATUS (Orb. et Lafr.). Cat. B. B. Mus. X. 605.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 367.

Ejemplares del Museo. * Buenos Aires (♂ ♀) Col. Schulz.

Nom. vulg.: Cachilo.

Nota: Esta especie es más bien escasa en Córdoba; vientre gris muy claro, salpicado de manchitas; dorso terroso, con manchas más oscuras. Las tres primeras plumas a cada lado de la cola, son mitad blancas, en sentido longitudinal.

ANTHUS LUTESCENS LUTESCENS (Pucher.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 367.

S i n o n. — *Anthus rufus* Lillo en Aves de la Provincia de Tucumán. p. 173.

Ejemplar del Museo. * Córdoba (♀) Col. Moxham.

Nom. Vulg.: Cachilo.

Nota: Es más común en Córdoba que la especie anterior, a la cual se asemeja mucho en el color, pero el tamaño es mucho menor.

FAM. MNIOTILTIDAE

MYIOBORUS BRUNNEICEPS (Orb.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 369.

Sinon. — *Setophaga brunneiceps*; Cat. B. B. Mus. X. 428.
Burm., La Plata Reise p. 473.

Ejemplar del Museo. * Tucumán (♂) Col. Schulz.

Nota: La especie no se encuentra en Córdoba.

GEOTHELYPIS STRAGULATA (Cab.). Mus. Hein. 17. 120.

Sinon. — *Trichas stragulata* (Licht.). Burm., Thiere Bra-
siliens p. 115.

Ejemplar del Museo. * Misiones (♀) Col. por la Exp. de
la Com. Arg. de Límites.

Nota: La especie no se encuentra en Córdoba.

BASILEUTERUS AURICAPILLUS (Swains.). Cat. B. B. Mus. X. 393.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos
Aires. Ser. III. t. XI. p. 368.

Ejemplar del Museo. * Tucumán (♂) Col. Schulz.

Nota: Vientre amarillo verdoso; dorso oscuro, verde aceituna; sobre
la cabeza una faja ancha, más clara que el vientre y sobre los ojos fajas
negras.

GEOTHELYPIS AEQUINOCTIALIS subesp, cucullata (Lath.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos
Aires. Ser. III. t. XI. p. 368.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♀) Col. Schulz.

Córdoba (♂ ♀) Col. Moxham.

Nota: Común en Córdoba en verano, viviendo por lo general en los
montes. La especie con cabeza gris es más oscura que la anterior.

FAM. VIREONIDAE

VIREO-SYLVIA CHIVI CHIVI (Vieill).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos
Aires. Ser. III. t. XI. p. 365.

Ejemplar del Museo. * Córdoba (♂) Col. Schulz.

Nota: La especie se encuentra en la provincia de Córdoba en primavera y verano.

CYCLARHIS GUJANENSIS VIRIDIS (Vieill.); C. E. Hellmayr. Nov. Zool. XV. p. 24.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 366.

S i n o n.—*Cyclorhis viridis*; Burm., La Plata Reise II. p. 472.

Ejemplar del Museo. * Córdoba (♂) Col. Schulz.

Nota: La especie se encuentra todo el año en los montes de la provincia de Córdoba. Dorso oscuro, verde aceituna; cuello gris perla; cabeza gris verdosa; faja rojo ferruginosa sobre los ojos. Vientre blanco amarillento. Pico lateralmente aplastado, curvo y amarillo.

FAM. HIRUNDINIDAE

PROGNE FURCATA Baird; Cat. B. B. Mus. X. p. 175.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 351.

S i n o n. — *Progne purpurea* Hudson, P. Z. S. 1872. p. 548.

Ejemplares del Museo. * San Luis (♀) Col. Schulz.

* Córdoba (♂ ♀ ♀) Col. Schulz.

Córdoba (♂ joven) Col. Moxham.

Nom. vulg.: Golondrina.

Nota: La especie es muy abundante en el verano en Córdoba y la más conocida entre las golondrinas.

IRIDOPROENE LEUCORRHOA (Vieill.); Ridg. op. cit. p. 87.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 350.

S i n o n. — *Tachycineta leucorrhous* (Vieill.) en Lillo, Aves de la Provincia de Tucumán p. 174.

Cotyle tapera Burm., La Plata Reise. II. p. 477.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂♂ ♀). Col. Schulz.

Nom. Vulg.: Golondrina.

Nota: La especie no se encuentra en los alrededores de la ciudad de Córdoba. Los ejemplares del Museo, fueron cazados en la Sierra Grande. Vientre y cuello blanco sucio; cabeza y dorso, terroso oscuro, uniforme; porte posterior blanco sucio; cuerpo largo y delgado.

PYGOCHELIDON CYANOLEUCA (Vieill.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 352.

Sinon. — *Atticora cyanoleuca* (Vieill.). Cat. B. B. Mus. X. 186.

Ejemplar del Museo. * Misiones (♂) Col. por la Exp. de la Com. Arg. de Límites.

Nom. vulg.: Golondrina.

Nota: El ejemplar del Museo ha sido cazado en San Pedro (Misiones).

COTYLE LEUCOPTERA (Gmel.)? Burm., La Plata Reise. II p. 478.

Ejemplar del Museo. * Misiones (♂) Col. por la Exp. de la Com. Arg. de Límites.

Nom. vulg.: Golondrina.

ALOPOCHELIDON FUCATUS (Temm.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 353.

Sinon. — *Atticora fucata* (Temm.).

Ejemplar del Museo. Córdoba (?) Col. Moxham.

Nom. vulg.: Golondrina chica.

Nota: Es una de las especies más abundantes en Córdoba. Dorso gris oscuro, cuello rojo-ferruginoso; cabeza, gris oscuro, salpicada de manchas rojizas, garganta y pecho gris perla; vientre y bajo vientre, blancos.

FAM. TANAGRIDAE

TANAGRA SAYAGA (Linn.); Cat. B. B. Mus. IX. 158.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 376.

Ejemplares del Museo. * Tucumán (♀ ♀) Col. Schulz.

Nota: La especie no es rara en la Provincia de Córdoba. Vive más bien en las sierras. Dorso, cola y alas azul-verdoso; cabeza y vientre gris claro verdoso.

TANAGRA BONARIENSIS (Gm.); Cat. B. B. Mus. XI. 164.

Dabbene, l. c., Ser. III. t. XI. p. 376.

S i n o n.—*Tanagra striata* Burm., La Plata Reise. II. p. 480.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂ ♀) Col. Schulz.

Córdoba (♂ joven) Col. Moxham.

Capilla del Monte (♀) Col. Rothlin.

Nom. vulg.: Tres colores, Naranjero.

Nota: La especie es la Tanagrida más común en Córdoba. Cabeza azul ultramar; dorso negro; raíz de la cola, pecho y vientre anaranjados.

PIRANGA FLAVA (Vieill.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 376.

S i n o n.—*Pyranga Azaræ* (D'Orb.); Cat. B. B. Mus. XI. p. 186.

Ejemplares del Museo. * Río Guayquiraró (♂ joven) Col.

Schulz.

* Córdoba (♂ ♀) Col. Schulz.

Nota: Esta especie se encuentra en Córdoba todo el año. Como son muy ariscos parecen escasos. Fáciles de reconocer por el color rojo fuego de la garganta, del pecho y del vientre.

TACHYPHONUS CORONATUS (Vieill.); Cat. B. B. Mus. XI. p. 213.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 376.

Ejemplar del Museo. * Misiones (♂) Col. Comisión
Arg. de Límites.

Nota: La especie no se encuentra en Córdoba.

TACHYPHONUS RUFUS (Bodd.)?

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos
Aires. Ser. III. t. XI. p. 376.

Ejemplar del Museo. * (♂).

Nota: La procedencia de nuestro ejemplar es desconocida.

FAM. FRINGILLIDAE

ARREMON ORBIGNII (Selat.); Sel. et Salv. Nomencl. p. 25; Cat. B.
B. Mus. XI. 274.

Dabbene, l. c. p. 395.

Ejemplar del Museo. * Tucumán (♂) Col. Schulz.

Nota: El ejemplar del Museo ha sido cazado en Tucumán.

No se encuentra en la Provincia de Córdoba.

ATLAPETES CITRINELLUS Cab.;

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos
Aires. Ser. III. t. XI. p. 396.

S i n o n. — *Buarremon citrinellus* Cab.; Journ. f. Orn.
1883. p. 109. Cat. B. B. Mus. XI. p. 270.

Ejemplares del Museo. * Tucumán (♂ ♂ ♀) Col. Schulz.

Nota: Según el catálogo de Dabbene, tanto esta especie como la *ante-*
rior son Fringillidos y no Tanagridos.

No se encuentra en la Provincia de Córdoba.

SALTATOR AURANTIROSTRIS (Vieill.); Cat. B. B. Mus. XI. p. 292

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos
Aires. Ser. III. t. XI. p. 381.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂) Col. Schulz.

* Río Guayquiraró (♂ ♀) Col. Schulz.

Nom. vulg.: Pepitero o semillero.

Nota: Esta especie se encuentra en Córdoba todo el año. Es muy parecida a *S. coerulescens*. Esta última especie nunca se halla en la provincia de Córdoba.

SALTATOR COERULESCENS-COERULESCENS Vieill;

Dabbene, l. c., Ser. III. t. XI. p. 380.

Sinon. — *Saltator coerulescens* (Vieill.). Cat. B. B. Mus. XI. p. 290; Lillo, Aves de la Provincia de Tucumán; Hudson, Arg.

Orn. Vol. I. p. 42; Burm., La Plata Reise, II p. 480.

Ejemplar del Museo. * Tucumán (♂) Col. Schulz.

Nota: No se encuentra en Córdoba.

FAM. FRINGILLIDAE

PHEUCTICUS AUREIVENTRIS (Orb. et Lafr.); Cat. B. B. Mus. XII. 54.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 378.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂) Col. Schulz.

Córdoba (♀) Col. Moxham.

Córdoba (♂) Col. C. Barraza.

Nom. vulg.: Rey del bosque.

Nota: La especie es bastante común en las sierras de Córdoba. Los pájaros son muy desconfiados y difíciles de cazar. Cabeza, cuello y dorso negros; vientre amarillo; alas y cola con manchas blancas.

PHEUCTICUS TIBIALES. — Cat. B. B. Mus. XII. p. 53.

Ejemplar del Museo. (♂).

Nota: Faltando datos no sabemos de dónde procede el ejemplar. El color de las alas y de la cola, como igualmente su tamaño, es el mismo que el de la especie anterior, siendo el pico más robusto, su cabeza y su vientre amarillo, sin las manchas de *Pheucticus aureiventris*.

*CYANOCOMPSA CYANEA (Linn.). subesp. argentina Sharpe;

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 379.

Sinon. — *Guiraca cyanea* (Linn.). subesp. argentina Sharpe;

*Cat. B. B. Mus. XII. 73.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂ ♀) Col. Schulz.

* San Luis (♀ joven) Col. Schulz.

Nom. vulg.: Reyna mora, sacha-mora.

Nota: Se encuentra en Córdoba todo el año, no es abundante.

Cabeza azul ultramar, cuerpo azul más oscuro, las alas y la cola color negro, pico muy grueso.

PYRRHULA VULGARIS.

Ejemplares del Museo. * Alemania. (♂ ♀) Col. Schulz.

PASSER DOMESTICUS (Linn.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 307.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 390.

Ejemplares del Museo Córdoba (♂ ♀ ♂) Col. Moxham.

Nom. vulg.: Gorrión.

Nota: Esta especie se encuentra en toda la Provincia, tanto en las ciudades como en la campaña.

PAROARIA CAPITATA (Orb. et Lafr.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 812.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 400.

Ejemplares del Museo. * Guayquiraró (♂ ♀) Col. Schulz.

Nota: Semejante al anterior; no tiene penacho. No existe en la Provincia de Córdoba.

PAROARIA CUCULLATA (Lath.); Cat. B. B. Mus. XII. 809.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 400.

Ejemplares del Museo. Córdoba (♂) Col. Moxham.

Córdoba (♀) Col. Hosseus.

Nom. vulg.: Cardenal.

Nota: Muy común en el monte, es una de las aves más conocidas.

GUBERNATRIX CRISTATA (Vieill.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 815.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 401.

S i n o n. — *Gubernatrix cristatella*, Burm., La Plata Reise. II. p. 482.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♀) Col. Schulz.

Córdoba (♂) Col. Moxham.

Córdoba (♂) Col. J. Morra.

Nom. vulg.: Cardenal amarillo.

Nota: Bastante común, prefiere el monte.

EMBERNAGRA PLATENSIS (Gm.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 758.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 394.

Ejemplares del Museo. * Buenos Aires (♂) Col. Schulz.

Nota: Esta especie no se encuentra en esta Provincia.

EMBERNAGRA OLIVASCENS (Orb. et Lafr.); Cat. B. B. Mus. XII p. 759.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 394.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♀) Col. Schulz.

Córdoba (♂) Col. Rothlin.

Nota: Esta especie es muy parecida a *E. platensis*, y muy común en Córdoba. Parece escasa debido a que habita gran parte de su tiempo sobre el suelo.

A diferencia de la anterior, esta especie no tiene el dorso rayado.

PHRYGILUS ERYTHRONOTUS (Phil. et Landb.); Cat. B. B. Mus. XII.
p. 796.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 399.

S i n o n. — *Phrygilus dorsalis* (Cab.), Journ. f. Orn., 1883, p. 109.

Ejemplar del Museo. * Tucumán (♂) Col. Schulz.

Nota: No se encuentra en la Provincia de Córdoba. Se le distingue de sus congéneres por su dorso rojizo, con abundantes plumas. Su pecho gris azulado y garganta blanca.

PHRYGILUS FRUTICETI (Kittl.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 790.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 398.

Ejemplares del Museo. * Río Negro (♂ Col. Schulz.

* Río Colorado (♀) Col. Schulz.

Nota: Pecho, gris salpicado de negro; cabeza y dorso rayados; alas son dos fajas blancas; cola negro mate, es cuadrada.

PHRYGILUS CARBONARIUS (Orb. et Lafr.); Cat. B. B. Mus. XII.
p. 791.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 398.

Ejemplares del Museo. * Río Colorado (♂) Col. Schulz.

* Córdoba (♂ ♀) Col. Schulz.

Nota: La especie es semejante a la anterior; difiere por su menor tamaño.

PHRYGILUS UNICOLOR (Orb. et Lafr.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 792.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 398.

S i n o n. — *Prygilus rusticus*, Burm., La Plata Reise II. p. 487.

Ejemplar del Museo. * Córdoba (♂) Col. Schulz.

Nota: Esta especie es un poco más grande que *Ph. carbonarius* y como indica su nombre, es de color uniforme: gris azulado. Existe en las Sierras de Córdoba.

PHRYGILUS GAYI (Eyd. et Gerv.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 781.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 397.

Ejemplares del Museo. * Tierra del Fuego (♂ ♂) Col. E. Garzón.

Nota: Pecho amarillo verdoso; garganta y cabeza grises; dorso amarillo verdoso; cola gris, poco abierta; es una de las más bonitas especies.

PHRYGILUS ALAUDINUS (Kittl.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 793.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 399.

Ejemplar del Museo. Córdoba (♂) Col. Rothlin.

Nota: Pecho y garganta plumizos; dorso rayado de negro; plumas de la cola con manchas blancas alargadas.

Se encuentra en la Sierra de Córdoba; es escasa.

SALTATRICULA MULTICOLOR (Burm.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 737.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 393.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂ ♂) Col. Schulz.

Nota: Esta bonita ave es bastante común en la Provincia de Córdoba todo el año. Garganta blanca; raya blanca sobre los ojos, abajo negro. Pecho plumizo y vientre blanco; costados rojizos; dorso gris; cola redonda, con tres plumas de extremidad blanca, a cada lado.

DIUCA MINOR (Mol.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 801.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 399.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂ ♀) Col. Schulz.

Nota: Esta linda ave de plumaje gris con cuello y vientre blancos se encuentra en Córdoba todo el año, pero no es abundante. Es del tamaño del gorrión.

BRACHYSPIZA CAPENSIS CAPENSIS (P. L. S. Müll.);

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. 390.

S i n o n. — *Zonotrichia pileata* (Bodd.);

Zonotrichia matutina Burm., La Plata Reise II. p. 486.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂) col. Schulz.

* Córdoba Col. Schulz.

* Tucumán (♀) col. Schulz.

Nom. vulg.: Chingolo.

Nota: Después del *Molothrus bonariensis*, esta debe ser la especie que más abunda en la provincia de Córdoba.

Los dos últimos ejemplares del Museo pertenecen a una variedad.

BRACHYSPIZA CAPENSIS (P. L. S. Müll.). subesp. CANICAPILLA (Gould.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. 390.

S i n o n. — *Zonotrichia canicapilla* (Gould.). Cat. B. B. Mus. XII. p. 609.

” ” en Döering, Exp. al Río Negro. Zool. p. 39.

Ejemplar del Museo. * Río Colorado (♂) Col. Schulz.

Nom. vulg.: Chingolo.

Nota: Muy parecido a *B. capensis*; en tamaño es algo más robusto; la cabeza toda gris y sin cresta; todos los demás colores como la especie anterior.

AIMOPHILA WHITH (Sharpe.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 608.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 391.

S i n o n. — *Zonotrichia Whitii* Sharpe.

Zonotrichia strigiceps; Burm., La Plata Reise. II. p. 486.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂ ♀) Col. Schulz.

Nom. vulg.: Chingolo.

Nota: Aunque esta especie es bastante parecida a las dos anteriores, es fácil de reconocer por no tener las manchas color ferruginoso y negro en el pecho y mucho menos blanco bajo el pico; no tiene cresta; tiene dos fajas marrón sobre la cabeza.

MYOSPIZA MANIMBE (Licht.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 393.

S i n o n. — *Coturniculus peruanus* (Bp.); Hudson, Arg. Orn. p. 60.

Coturniculus manimbe Burm., La Plata Reise. II. p. 486.

Ammodromus manimbe (Licht.); Cat. B. B. Mus. XII. 691.

Ejemplares del Museo. Córdoba (♀) Col. Moxham.

Córdoba (♀) Col. Rothlin.

Nota: Es bastante común en Córdoba. Fácil de reconocer por una raya amarilla sobre los ojos y otra mancha del mismo color sobre la orilla posterior del ala; habita en el suelo.

LOPHOSPINGUS PUSILLUS (Burm.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 805.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 400.

S i n o n. — *Coryphospingus pusillus* (Salv.). Ibis. 1880. p. 354.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂ ♀) Col. Schulz.

Nota: Esta especie es más bien rara en la Provincia de Córdoba; en cambio en la de Catamarca parece que abunda mucho.

En la colección del Dr. J. Manin hay un lindo ejemplar ♂, cazado en la "Bajada Colorada". Esta avecita es fácil de reconocer por el copete que

tiene, muy largo y negro; la garganta del mismo color; sobre el ojo una raya ancha blanca; plumas sobre los oídos negras bordadas con otra raya blanca; vientre gris uniforme.

CORYPHOSPINGUS CUCULLATUS (P. L. S. Müll.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 400.

Sinon. — *Coryphospingus cristatus* (Gm.). Cat. B. B. Mus. XII. p. 803.

Ejemplar del Museo. * Tucumán (♀) Col. Schulz.

Nota: Esta especie es fácil de reconocer por su cresta colorada y vientre del mismo color; es bastante rara en la Provincia de Córdoba.

SPOROPHILA CAERULESCENS (Bonn. et Vieill.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 126.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 385.

Sinon. — *Sporophila ornata*; Burm., La Plata Reise. II. p. 488.

Spermophila caerulescens (Bonn. et Vieill.) Gray; en Lillo, Aves de la Prov. Tucumán, p. 177.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♀♀) Col. Schulz.

Córdoba (♂ joven) Col. Moxham.

Nom. vulg.: Corbatita.

Nota: Esta es una de las avecitas más conocidas en Córdoba; muy común en verano.

SPOROPHILA MELANOCEPHALA (MELANOCEPHALA) (Vieill.);

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 384.

Sinon. — *Spermophila melanocephala* (Vieill.) Gray; en Lillo, Aves de la Provincia de Tucumán. p. 177.

Spermophila melanocephala (Vieill.); en Hudson, Arg. Orn. p. 45.

Ejemplares del Museo. * Buenos Aires (♂ joven) Col. Schulz.

Nota: Esta especie es un poco más grande que la corbatita; dorso y cabeza marrón oscuro; bajo el pico, blanco; una faja negra en el pecho y todo el vientre color canela; alas manchadas de canela.

SPOROPHILA ANALIS (Orb.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 106.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 383.

S i n o n. — *Catamenia analis* (Orb. et Lafr.); en Hudson, Arg. Orn. p. 57.

Catamenia analis en Burm., La Plata Reise. II. p. 488.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂♂) Col. Schulz.

Nota: Esta especie se encuentra en Córdoba todo el año, pero es más bien escasa.

El tamaño y el pico, son como en las otras especies. El color es gris, casi uniforme; la cola negra, dividida en el medio por una faja ancha blanca y en las alas otra raya del mismo color.

SICALIS PELZELNI Sel; Cat. B. B. Mus XII. p. 380.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 388.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂♂♂♀♀) Col. Schulz.

Nom. vulg.: Jilguero.

Nota: Esta especie es muy abundante en Córdoba todo el año, y es una de las avecitas más conocidas.

SICALIS ARVENSIS ARVENSIS (Kittl.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 389.

Ejemplares del Museo. * San Luis (♂♀). Col. Schulz.

Nom. vulg.: Mirto.

Nota: Esta especie parece mucho más escasa en Córdoba que la *S. Pelzelni*, la razón puede ser que ésta es habitante más bien de la ciudad y la otra avecita del campo. Aunque ambas son bastante parecidas, no es difícil de separarlas; *S. arvensis* tiene la cabeza y lomo verde uniforme sin rayas, en cambio *S. Pelzelni* tiene el lomo gris oliváceo y muy rayado.

OROSPINA PRATENSIS Cab.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 389.

S i n o n. — *Pseudochloris pratensis* (Cab.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 779.

Ejemplar del Museo. * Tucumán (♂) Col. Schulz.

Nota: Esta linda avecita es habitante de las sierras altas de Tucumán, donde fué descubierta por el señor Schulz; esta especie no sale de dicha Provincia. Pecho amarillo verdoso; dorso muy oscuro y rayado verdoso.

SPINUS BARBATUS (Mol.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 387.

S i n o n. — *Chrysomitris barbata* (Mol.). Cat. B. B. Mus. XII. p. 216.

Chrysomitris barbata (Mol.); en Döring, Exp. al Río Negro Zool. p. 40.

Ejemplar del Museo. * Buenos Aires (♀) Col. Schulz.

Nota: Esta especie es un poco más grande que la cabecita negra de la Provincia de Córdoba; también la hembra difiere en el cuello, vientre y dorso, que es todo de un color bastante más claro; el pico más robusto y color claro; en las alas hay dos fajas amarillas visibles, cuando el ala está cerrada.

SPINUS ICTERICUS ICTERICUS (Licht.).

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 387.

Ejemplares del Museo. Córdoba (♂ ♀) Col. Moxham.

Nom. vulg.: Jilguero. Cabecita negra.

Nota: Esta avecita es muy conocida en Córdoba, parece ser mucho más abundante en verano. Es probable que vayan más al norte con la entrada de la estación fría; sin embargo, algunas quedan todo el año. La hembra difiere de la especie anterior por tener el pico más chico y color negro, el dorso más oscuro, vientre más bien gris y en las alas dos fajas amarillas, pero solamente una es visible, cuando el ala está cerrada.

POOSPIZA MELANOLEUCA (Orb. et Lafr.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 638.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 391.

Ejemplar del Museo. * Córdoba (♂) Col. Schulz.

Nota: Esta linda avecita es fácil de reconocer de las otras *Poospizas*, por tener el plumaje muy distinto, la cabeza negra, todo el lomo gris; cuello, pecho y vientre blanco puro. Se encuentra en Córdoba todo el año, pero no es muy abundante.

POOSPIZA PERSONATA (Swains.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 640.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 391.

S i n o n. — *Poospiza nigrorufa* (Orb. et Lafr.); Döring, Exp. al Río Negro. Zool. p. 38.

Poospiza nigrorufa; en Hudson, Arg. Orn. p. 49.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂ ♂ ♀) Col. Schulz.

Nota: Esta especie se encuentra en Córdoba todo el año; difiere de la descripción de Hudson en que el dorso y cabeza no son negros, solamente la cola es de dicho color, tampoco las dos rayas que tiene en la cabeza no son de color paja, sino blanco puro; una sobre el ojo, la otra abajo, sobre los oídos, casi negros; todo el lomo gris uniforme; pecho castaño oscuro; vientre blanco.

POOSPIZA ERYTHROPHRYS Sel.; Cat. B. B. Mus. XII. p. 642.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 392.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♂ ♂) Col. Schulz.

Nota: Esta especie es algo parecida a *S. personata*; difiere por tener una raya blanca en el ala; cuello, pecho y vientre castaño rojizos; una raya del mismo color sobre el ojo; dorso gris oliváceo. Debe ser muy rara en Córdoba, porque pocas veces se ha visto esta especie en la Provincia.

POOSPIZA ORNATA "Landb."—Sel. et Salv.; Cat. B. B. Mus. XII. p. 643.

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 392.

Ejemplar del Museo. * Córdoba (♂) Col. Schulz.

Nota: Esta especie es también bastante rara en la Provincia de Córdoba. Se diferencia fácilmente de las otras especies por el cuerpo, que es abajo color canela claro, más obscuro sobre el pecho. Sobre el ojo una raya del mismo color, pero más pálida; dorso gris claro con manchas negras; cabeza y cola gris obscuro bordeada de blanco; en las alas dos fajas blancuecinas.

POOSPIZA TORQUATA (Orb. et Lafr.); Cat. B. B. Mus. XII. p. 645;

Dabbene, Cat. Sist. Aves Arg. en An. Mus. Nac. Buenos Aires. Ser. III. t. XI. p. 392.

Ejemplares del Museo. * Córdoba (♀ dom. jov.) Col. Schulz.

Nota: Esta es la especie que más abunda en Córdoba; parece preferir la región de arbustos. En tales sitios, se puede ver esta avecita siempre muy preocupada, saltando de rama en rama en busca de insectos. Se distingue fácilmente de sus congéneres.

El color del dorso es gris, una ceja blanca se extiende desde los respiraderos nasales hasta la nuca; bajo los ojos fajas negras; garganta blanco puro, en el pecho una faja ancha casi negra; vientre blanco. Las plumas de la región anal son de color rojizo claro; en el ala una faja blanca y piezo negro.

DACNIS CYANOMELAS (Gmel.).

Ejemplar del Museo. * Brazil (♂) Col. C. Berg.

(Continuará)