

Resumen #743

Estudio exploratorio de los factores que intervienen en las internaciones prolongadas por causas mentales en la infancia en Córdoba

¹Rossetti ME, ¹Decca MG, ²Bella ME

¹Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.; ²Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Facultad de Ciencias Médicas Escuela de Salud Pública UNC

Persona que presenta:

Rossetti ME, merorossetti@hotmail.es

Área:

Epidemiológica / Salud Pública

Resumen:

La internación en salud mental es un dispositivo de atención de tercera complejidad y el último recurso terapéutico a utilizarse, por el menor tiempo posible, cuando otras instancias terapéuticas han sido agotadas según lo establecido en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Objetivo: analizar las causas que motivan una internación psiquiátrica prolongada en niños-adolescentes de la ciudad de Córdoba.

Estudio retrospectivo, descriptivo, en base a los registros clínicos de niños y adolescentes hospitalizados en el Hospital de Niños de Córdoba entre los años 2009- 2014. Las variables categorizadas fueron sexo, edad, motivo de ingreso, diagnóstico psicopatológico, grupo de convivencia, escolaridad, días de internación en hospitalizaciones entre 30-60 días y más de 60 días. Los datos se analizaron por análisis de frecuencias y test de chi-cuadrado.

Se efectuaron 419 hospitalizaciones en el periodo 2009-2014 con una estadía de hospitalización mínima de 1 día, máxima de 243 días y media de 22 días de internación. En 72 (17%) registros se observó más de 30 días de hospitalización y de estos 51 correspondieron a internaciones entre 30-60 días y 21 a más de 60 días. Los motivos de internación más frecuentes para el grupo de 30-60 días fueron los comportamientos suicidas 23,5% y episodios de excitación psicomotriz 17,6%. En las internaciones de 60 días o más fueron los episodios de excitación psicomotriz 28,5% y hetero-agresión 33,3%. Tanto los motivos de ingreso como los diagnósticos de egreso mostraron un comportamiento diferenciado por género. En los hombres los diagnósticos más frecuentes fueron los trastornos del comportamiento y en las mujeres los trastornos del desarrollo de la personalidad. Las hospitalizaciones más prolongadas mostraron diferencias significativas en niños que viven en condición de hogarizados ($p < 0,0005$).

Las hospitalizaciones prolongadas mostraron un comportamiento diferenciado por género, se asociaron a patologías del espectro impulsivo-agresivo y factores de vulnerabilidad social.

Palabras Clave:

hospitalización; salud mental; comportamientos suicidas; trastornos del comportamiento; género.

Exploratory study of factors which intervene in prolonged hospitalizations in infancy due to mental causes in the city of Córdoba

¹Rossetti ME, ¹Decca MG, ²Bella ME

¹Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.; ²Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Facultad de Ciencias Medicas Escuela de Salud Pública UNC

Persona que presenta:

Rossetti ME, merorossetti@hotmail.es

Abstract:

Hospitalization in mental health is a measure of care of third level complexity and the last therapeutic measure to utilize for the least possible time when other therapeutic instances have been exhausted, according to what has been established in the law "Ley Nacional de Salud Mental Nro 26.657. Objective: To analyze the causes which motivate a prolonged psychiatric hospitalization of children/adolescents in the city of Cordoba.

Retrospective study, descriptive, based on clinical registries of children/adolescents hospitalized in Hospital de Niños de Cordoba between years 2009-2014. The categorized variables were sex, age, reason of intake, psychopathological diagnosis, living group, schooling, days of hospitalization for hospitalizations between 30-60 days and more than 60 days. The data was analyzed by Analysis of frequencies and Chi-square test.

Four hundred and nineteen hospitalizations were performed in the period 2009-2014 with a minimum hospital stay of 1 day, maximum 243 days, and media 22 days of hospitalization. In 72 (17%) of the registries was observed more than 30 days of hospitalization in which 51 corresponded to hospitalizations between 30-60 days and 21 to more than 60 days. The most frequent reasons of hospitalization for group 30-60 days were suicidal behaviors 23,5%, and psychomotor exacerbation episodes 17,6%. In hospitalizations of 60 days or more were episodes of psychomotor exacerbation 28,5% and hetero-aggression 33,3%. Reasons of intake, as well as diagnosis of release, showed a differentiated behavior by gender. In males, the most frequent diagnosis was behavior disorders and in females developmental personality disorders. The most prolonged hospitalizations showed significative difference between children who live in conditions of shelter ($p < 0,0005$).

Prolonged hospitalizations evidenced a differentiated behavior by gender associated to pathologies of impulsive-aggressive spectrum and factors of social vulnerability.

Keywords:

Hospitalization; mental health; suicidal behaviors; behaviors disorders; gender.