



<a href="#">Inicio</a>	<a href="#">Reglamento</a>	<a href="#">Reporte de resúmenes</a>	<a href="#">Programa</a>	<a href="#">Distribución de trabajos</a>
<a href="#">Mi cuenta</a>	<a href="#">Cerrar sesión</a>			

## Administración

### Panel de Control

[Asignar coordinadores](#)

[En revisión](#)

[Enviados a corregir](#)

[Aprobados por coordinador](#)

[Aprobados por revisor](#)

[En traducción](#)

[Listo para publicar](#)

169

[Rechazados](#)

5

[Resúmenes Corrección](#)

[Inicio](#) » Prevalencia de acúfenos y uso de dispositivos electrónicos en población de la Provincia de Córdoba

[Vista](#)

[Diferencias](#)

[Editar](#)

[Revisiones](#)

## Resumen #1697

### Prevalencia de acúfenos y uso de dispositivos electrónicos en población de la Provincia de Córdoba

<sup>1</sup>Vargas D, <sup>1</sup>Cruz FV, <sup>1</sup>Franco Fernández A, <sup>1</sup>Parra SM, <sup>1</sup>Lucca ME  
<sup>1</sup>Escuela de Fonoaudiología. FCM. UNC

**Persona que presenta:** Cruz FV, victoria.cruz@mi.unc.edu.ar

**Área:** Epidemiológica / Salud Pública

**Disciplina:** Salud Pública

#### Resumen:

El presente estudio evaluó la prevalencia de acúfenos y el uso de dispositivos de audio entre la población de Córdoba.

Se realizó un estudio descriptivo transversal con una muestra de 1402 participantes, recolectando datos mediante una encuesta administrada en formato Google Forms. Los participantes respondieron preguntas sobre controles auditivos, acúfenos y el uso de dispositivos de audio. El análisis se llevó a cabo utilizando software estadístico para evaluar frecuencias y porcentajes, además de realizar análisis cruzados para examinar las relaciones entre las variables.

Los resultados mostraron que el 53.1% de la población se ha realizado controles auditivos, y que el 4.2% experimenta acúfenos constantemente, mientras que el 75.9% los experimenta ocasionalmente. El 60.8% de los encuestados usa dispositivos de audio regularmente, siendo los auriculares los más comunes. Aunque inicialmente se observó una posible relación entre el uso de dispositivos de audio y la prevalencia de acúfenos, el análisis estadístico no confirmó una asociación significativa ( $p = 0,2290$ ). Es importante destacar que la muestra tenía disparidades en edad, sexo y nivel educativo, lo que podría haber afectado los resultados y la representatividad. El análisis demográfico reveló que los jóvenes y los hombres reportan una mayor prevalencia de acúfenos en comparación con otros grupos.

En conclusión, es importante destacar que los resultados obtenidos subrayan la importancia de implementar medidas de protección auditiva y promover prácticas seguras de uso de dispositivos de audio.

**Palabras Clave:** Dispositivos electrónicos, acúfenos, controles auditivos.

 [Versión para impresión](#) |  [PDF version](#)

Abstract #1697

## Prevalence of tinnitus and use of electronic devices in the population of the province of Córdoba

<sup>1</sup>Vargas D, <sup>1</sup>Cruz FV, <sup>1</sup>Franco Fernández A, <sup>1</sup>Parra SM, <sup>1</sup>Lucca ME  
<sup>1</sup>Escuela de Fonoaudiología. FCM. UNC

**Persona que presenta:** Cruz FV, victoria.cruz@mi.unc.edu.ar

### Abstract:

The present study evaluated the prevalence of tinnitus and the use of audio devices among the population of Córdoba.

A cross-sectional descriptive study was conducted with a sample of 1402 participants, collecting data through a survey administered via Google Forms. Participants answered questions about hearing check-ups, tinnitus, and the use of audio devices. The analysis was carried out using statistical software to evaluate frequencies and percentages, in addition to performing cross-sectional analysis to examine the relationships between the variables.

The results showed that 53.1% of the population has had hearing checks, and that 4.2% experience tinnitus constantly, while 75.9% experience it occasionally. Additionally, 60.8% of respondents use audio devices regularly, with headphones being the most common. Although a possible relationship between the use of audio devices and the prevalence of tinnitus was initially observed, statistical analysis did not confirm a significant association ( $p = 0.2290$ ). It is important to note that the sample had disparities in age, gender, and educational level, which could have affected the results and representativeness. The Demographic analysis revealed that young people and men report a higher prevalence of tinnitus compared to other groups.

In conclusion, it is important to highlight that the results obtained underline the importance of implementing hearing protection measures and promoting safe practices for the use of audio devices.

**Keywords:** Electronics devices, tinnitus, hearing test